

Дәріс 9.

Шизофрения. Эпилепсия.

PhD Камзанова А.Т.

Шизофрения

- жиі жас кезде пайда болатын созылмалы психикалық эндогенді үдемелі ауру жиы О. Бейлер « Шизофрения » терминін ұсынған (гр. тілінен schiso- ыдырау, phren – жан денег мағынаны білдіреді).

Шизофрения

- созылмалы процесті, этиологиясы жағынан айқындалмаған ауру;
- жиі кездесетін психикалық аурулардың бірі;
- ауру жастық шақта жиі кездеседі (20-25 жас аралығында басталады);
- ойлаудың бұзылуының ұлғаюына, сезімдік әсерлер мен ерік көріністерінің жұтаңдауына, енжар кемақылдық күйге әкеледі.

Шизофрения Sch

- кез-келген жас кезеңінде басталуы мүмкін. Дегенмен шизофрения дамуына аса тән жас кезеңі 20-25жас. Шизофренияның бастапқы клиникалық көріністерінің кейбірінің өзіндік оптимальды мезгілі бар. Параноидты көріністермен шизофрения невроз тәрізді симптоматикамен жиі 30 жастан кейін, ойлау бұзылысы көрінісімен-жасөспірімдік шақта басталады. Ер адамдарда әйелдерге қарағанда ауру ерте басталады. Клиникалық көрінісінде де науқас жынысына қарай ерекшеліктер болады. Әйелдерде ауру жедел өтеді, әртүрлі аффективті патология жиі және айқынырақ болады.

Шизофрения симптомдары

- Ойды тартып алу симптомы (қандай бір сыртқы күш оның басындағы ойын тартып алған сияқты деп айтады);
- Сендірілген ойлар симптомы (ауру оның басына оған тән емес, бөгде ойлар келеді деп айтады);
- Кандинский-Клерамбо синдромы, психикалық жаттандылық синдромы;
- Ипохондриялық сандырақ идеялары;
- Галлюцинация және естудегі жалған галлюцинация жиі байқалады.

Шизофрения ның формалары

-
-
- Параноидты формасы
- Гебефрендік формасы
- Кататоникалық формасы
- Қарапайым формасы
- Циркулярлы формасы
- Сенестопатиялы-ипохондриалық формасы

Эпилепсия. Оның түрлері.

- ұстамалы аурулар;
- ұстаманың психикалық баламасы болып табылатын кеселдер;
- жеке бастың өзгеруі (ұзақ уақыт бойы берік, өршіген түрде болатын бұзылыстар).